

**KDL**www.kdllab.ru
8 (800) 700-60-40

Услуги лицензированы. Качество клинических лабораторных исследований соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 15189-2009, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, OHSAS 18001:2007.

№ направления:	650214158	дата:	2017-02-28	Фамилия:	Соловьев
ЛПУ:	6502 - МО Бакалинская	Имя:	Вячеслав Федорович		
В	3000	Дата рождения:	1987-01-09		
Адрес пациента:	г.Уфа	Пол:	мужской		

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
---------------------------	-----------	----------	---------------------

ГОРМОНЫ

Пролактин	60.39	-	мМЕ/л	72.66 - 407.4
Эстрадиол	101.0		пмоль/л	

Референсные пределы

Возраст	девочки	мальчики
0-12 месяцев	28,2-155,9	30,3-85,6
1-5 лет	31,7-97,8	15,5-84,1
6-10 лет	30,3-137,8	14,8-69,2
11-14 лет	26,9-354,6	28,8-113,4
15-20 лет	34-953,4	29,6-181,9
Женщины		
Фолликулярная фаза	77,07-921	
Фаза середины цикла	140-2382	
Лютеиновая фаза	77,07-1145	
Женщины в постменопаузе (без ГЗТ)	<36,7 - 103	
Женщины в постменопаузе (на ГЗТ)	<36,7-528,5	
Мужчины	40,37-161,48	

Тестостерон свободный	373.00	+	пг/мл	5.5 - 42
Тестостерон общий	88.70	+	нг/мл	1.66 - 8.11

Рекомендации Европейской ассоциации урологов (EAU) и (ISSAM) по диагностике гипогонадизма у мужчин:
 более 12 нмоль/л (3,46 нг/мл) - нормальный уровень тестостерона;
 8-12 нмоль/л (2,30 -3,46 нг/мл) - рекомендовано определение свободного тестостерона;
 менее 8 нмоль/л(2,30 нг/мл) - сниженный уровень тестостерона

Глобулин, связывающий половые гормоны	4.5	-	нмоль/л	17.1 - 77.6
Индекс свободных андрогенов	6833.8	+	%	20.4 - 81.2